



Cena zabiegu: 4900 zł

**PRZYGOTOWANIE DO OPERACJI ŻYŁAKÓW KOŃCZYN
DOLNYCH METODĄ WEWNĄTRŻYŻYLNĄ Z MINIFLEBEKTOMIĄ-
METODA HYBRYDOWA (ŁĄCZONA) i/lub ECHOSKLEROTERAPIĄ**

ZABIEG ODBĘDZIE SIĘ W NASZEJ SIEDZIBIE UL. ŻÓŁKIEWSKIEGO 40 W BIELSKU-BIAŁEJ.



Zabieg **WEWNĄTRŻYŻYLNÝ** przeprowadzony jest w sterylnych warunkach i przeprowadzony jest pod kontrolą ultrasonografii. Najpierw wykonuje się przezskórne nakłucie żyły igłą i wprowadzanie włókna od światła żyły powierzchniowej. Następnie wycofując włókno dokonuje się przy użyciu energii cieplnej zamknięcia światła żyły. Zabieg przeprowadzony jest znieczuleniu tumescencyjnym i miejscowym. Czasami jeżeli są duże kręte żylaki zabieg może być wykonany wieloetapowo i uzupełniony lub zastąpiony miniflebektomią lub safenektomią i/lub echoskleroterapią.

MINIFLEBEKTOMIA to nowoczesna i małoinwazyjna operacja żylaków kończyn dolnych, polegająca na usunięciu chorobowo zmienionych żył za pomocą specjalnych haczyków chirurgicznych - Varady, poprzez 1-2 mm nacięcia skóry. Mikronacięcia nie wymagają zszycia skóry, co pozwala na uzyskanie dobrego efektu estetycznego i powrót do codziennej

aktywności w ciągu kilku dni po zabiegu. Zabieg jest wykonywany w trybie chirurgii jednego dnia w znieczuleniu z opieką anestezyjologiczną, co zapewnia pacjentowi bezpieczeństwo i komfort zabiegu.

SAFENEKTOMIA, stripping to chirurgiczne usuwanie dużych niewydolnych pni żylnych za pomocą sondy wprowadzonej do wnętrza naczynia. Zabieg wykonywany jest w trybie chirurgii jednego dnia w znieczuleniu z asystą anestezyjologa co zapewnia pacjentowi bezpieczeństwo i komfort zabiegu. Usunięcie niewydolnego pnia żylnego może powodować powstanie krwiaka, który stopniowo znika w ciągu 2-3 tygodni. Jeżeli istnieje taka potrzeba, zabieg można rozszerzyć o miniflebektomię oraz o podwiązanie niewydolnych perforatorów żylnych.

ECHOSKLEROTERAPIA to nowoczesna odmiana skleroterapii czyli zabiegu zamknięcia światła żylaków za pomocą wstrzyknięcia środka farmakologicznego który prowadzi do stopniowego zwłóknienia żyły i jej powolnego zaniku. Po zabiegu w miejscu wstrzyknięcia mogą pojawić się krwiaki, ich obecność nie wymaga żadnego leczenia i powinny one ustąpić samoistnie w ciągu następnych dwóch tygodni. W większości przypadków przebarwienia znikają w ciągu miesiąca po zabiegu, jednak część z nich (bardzo rzadko) może utrzymywać się ponad rok. W okolicy miejsc ostrzykniętych mogą powstać nowe żylaki i "pajęczki" (bardzo rzadko). Sporadycznie może wystąpić martwica skóry (owrzodzenie), zapalenie żył, zakrzepica żył głębokich i reakcje alergiczne, rekanalizacja żyły.

Kwalifikacja pacjentów- Kwalifikacja do zabiegu opiera się na badaniu przedmiotowym oraz badaniu USG metodą Dopplera, która pozwala na ocenę wydolności zastawek w ujściach żył odpiszczelowych.

DO ZABIEGU WSKAZANY JEST ZAKUP POŃCZOCHY UCISKOWEJ

Przygotowanie do zabiegu:

- Konsultacja anestezyjologiczna na kilka dni przed zabiegiem
- Leki zażywane na stałe na nadciśnienie i na serce zażyć planowo oraz zabrać ze sobą
- Leki rozrzedzające i przeciwplatekcyjne (Polopiryna, Ticlo, Aclofin, Acenocumarol) odstawić na 5 dni przed zabiegiem
- Ogolić całą nogę aż do pachwiny
- min 6 godzin przed planowanym zabiegiem nie jeść, a 4 godziny przed nie pić.
- Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości
- Pantofle, okulary do czytania, jeśli Pacjent używa
- Osoba towarzysząca i transport do domu po zabiegu

Przedstawić wyniki BADAŃ: morfologia, INR, APTT- czas KK, sód, potas, grupa krwi (oryginał wyniku laboratoryjnego), EKG po 40-tym roku życia. Pobieranie badań laboratoryjnych Euroklinika ul. Żółkiewskiego 40 pon-pt 7:30-9:30 po uprzedniej rejestracji.

Przewidywany czas pobytu na oddziale ok.3-8 godziny. Wyznaczona godzina zabiegu może ulec przesunięciu ponieważ czas trwania zabiegu u każdego pacjenta jest indywidualny i trudny do przewidzenia.

UWAGA: ZABIEG JEST WYKONYWANY W ZNIECZULENIU OGÓLNYM-DOŻYLNYM. W TYM DNIU I KONIECZNA JEST OPIEKA DRUGIEJ OSOBY.